

Canadienne

Analyse de conformation - Femelle

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Nom/n° d'étable | Propriétaire | | Date de la visite | | |
| N° d'enregistrement | N° d'enregistrement du père | Date de naissance | Date de vêlage | N° de lactation | |

| Section | Pointage | Caractères descriptifs | Caractères déficients |
|---------|----------|------------------------|-----------------------|
|---------|----------|------------------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Croupe (10 %) | Angle de la croupe (34 %) | haut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bas | 10 Anus avancé _{2,5} |
| | Largeur aux ischions (26 %) | étroite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large | |
| | Force du rein (30 %) | faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fort | |
| | Position du trochanter (10 %) | reculé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 avancé | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Système mammaire (43 %) | Plancher de pis (4 %) | Incliné 1 2 3 4 5 6 7 8 9 incliné vers l'avant | 23 Arr.-pis court ₁ 26 Quartier improductif ₈ 24 Manque de forme ₁ 27 Trayon double ₂ 25 Quartier non équilibré ₁ 29 Trayons arr. trop arr. ₁ |
| | Profondeur du pis (14 %) | profond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peu prof. | |
| | Texture du pis (14 %) | charnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 souple | |
| | Suspension médiane (12 %) | faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 forte | |
| | Attache avant (16 %) | faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 forte | |
| | Position trayons avant (4 %) | éloignés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapprochés | |
| | Hauteur attache arrière (13 %) | basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute | |
| | Largeur attache arrière (13 %) | étroite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large | |
| | Position trayons arrière (6 %) | éloignés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapprochés | |
| | Longueur des trayons (4 %) | courts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 longs | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Puissance laitière (22 %) | Stature (11 %) | courte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grande | 42 Côtes av. peu prof. _{1,5} 44 Dos faible _{1,5} 43 Arr. épaule faible _{1,5} |
| | Hauteur à l'avant-train (0 %) | basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute | |
| | Largeur du poitrail (21 %) | étroit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large | |
| | Profondeur du corps (21 %) | peu prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 profond | |
| | Structure des côtes (28 %) | faible capacité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grande capacité | |
| | Cote de chair (6 %) | basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute | |
| | Texture du pis (7 %) Force du rein (9 %) | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Pieds et membres (25 %) | Angle du pied (25 %) | bas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 incliné | 30 anormalité de pince _{1,5} 35 Membres arrière reculés _{1,5} 31 Paturons faibles _{1,5} 36 Pieds avant ext. _{1,5} 34 Raideur ₃ |
| | Profondeur du talon (24 %) | peu prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 profond | |
| | Valeur combinée du pied (recherche) | non fonctionnelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fonctionnelle | |
| | Qualité de l'ossature (5 %) | grossière 1 2 3 4 5 6 7 8 9 raffinée | |
| | Vue côté-membres arrière (18 %) | droits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coudés | |
| | Vue arrière membres (26 %) | vers l'int. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 droits | |
| | Vue avant des membres avant (0 %) | genoux cagneux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 genoux arqués | |
| | Locomotion (0%) Position du trochanter (2 %) | non mobile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mobile | |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| Classe | Pointage | Commentaires : |
|---------------|-----------------|-----------------------|